

## Fragenkatalog Erste Hilfe

Vorname:         Rupert              Zuname:         Gruber        

Punkteanzahl:                                  von 100

### 1 Wie lautet der Euro-Notruf?

- 122
- 133
- 144
- 112

### 2 Wie lautet die Notrufnummer der Feuerwehr?

- 122
- 133
- 144
- 112

### 3 Wie lautet die Notrufnummer der Polizei ?

- 122
- 133
- 144
- 112

### 4 Wie lautet die Notrufnummer der Rettung?

- 122
- 133
- 144
- 112

### 5 Wie verhalten Sie sich am Notfallort (Verkehrsunfall)?

- Ausreichende Absicherung
- Rettung von Verletzten
- Selbstschutz beachten
- Rettung von Kindern aus der Gefahrenzone

---

Erreichte Punkte dieser Seite:           
Erreichte Punkte bisher:         

Gesamtpunkte dieser Seite: 5

## 6 Wie wird das Bewusstsein im Rahmen der Ersten Hilfe überprüft?

- Notfallpatient sanft massieren, bis der Notarzt eintrifft
- Durch lautes Ansprechen, sanftes Schütteln an den Schultern
- Pupillenreflexe des Patienten mit einer Taschenlampe überprüfen
- Schmerzreiz an beiden Ohren durchführen

## 7 Womit kann ein Verkehrsunfall abgesichert werden?

- Pannendreieck
- Ampel
- Warnblinkanlage
- Sonderzeichen

## 8 Worauf hat der Ersthelfer bezüglich seines persönlichen Schutzes auf Autobahnen und Autostraßen zu achten?

- Warnweste tragen
- Gefahrenbereich nur zur Rettung betreten
- Selbstschutz beachten
- Warnblinkanlage einschalten

## 9 Welchen Grundsatz soll jeder Ersthelfer in einer Gefahrenzone beachten?

- Selbstschutz geht vor Fremdschutz!
- Es gibt kein Gefahrenpotential bei der Leistung von Erster Hilfe
- Fremdschutz geht vor Eigenschutz!
- Einer für alle - alle für Einen!

## 10 Welche Lagerung wird bei einer Kopfverletzung (Erste Hilfe) durchgeführt?

- Stabile Seitenlage
- Bein-Hochlagerung
- Oberkörper-Hochlagerung
- Keine spezielle Lagerung erforderlich

## 11 Welche lebensrettenden Sofortmaßnahmen gibt es?

- Wiederbelebung
- Retten von Verletzten
- Blutstillung
- Freihalten der Atemwege

**12 Welche Rettungsmöglichkeiten gibt es aus einer Gefahrenzone?**

- Rautek-Griff
- Wegziehen
- Ast-Trage
- Tragegurt

**13 Welche Lagerung wird bei Atemnot (Erste Hilfe) durchgeführt?**

- Stabile Seitenlage
- Oberkörper-Hochlagerung
- Keine besondere Lagerung erforderlich
- Bein-Hochlagerung

**14 Welche Lagerung wird bei Bauchverletzungen (Erste Hilfe) durchgeführt?**

- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper
- Flache Rückenlagerung mit angezogenen Beinen
- Bein-Hochlagerung
- Deckenrolle unter den Knien

**15 Welche Glieder der Rettungskette gibt es?**

- Rettungsdienst
- Vergiftungsinformationszentrale
- Erste Hilfe leisten
- Warnweste anziehen

**16 Welche Haltung muss der Helfer bei der psychischen Betreuung haben?**

- Einfach sprechen, keine medizinischen Fremdwörter verwenden
- Die Gefühle des Patienten müssen akzeptiert werden
- Zusagen und Versprechen sollen eingehalten werden
- Mit Psychotricks arbeiten, um den Patienten zu beruhigen

**17 Welche Informationen benötigt die Leitstelle beim Absetzen eines Notrufes?**

- Wo ist der Notfallort?
- Was ist geschehen?
- Wer ruft an?
- Wie viele Menschen sind betroffen?

**18 Welche Erste-Hilfe-Ausrüstung kann den Helfer vor Infektionen schützen?**

- Beatmungstuch
- Einmalhandschuhe
- Taschentuch
- Warnblinkanlage

**19 Welche Basismaßnahmen soll der Ersthelfer durchführen?**

- Lagerung - dadurch weniger Schmerzen
- Frische Luft - beengende Kleidungsstücke öffnen
- Wärme - zudecken und beim Verletzten bleiben
- Psychische Betreuung, für Ruhe sorgen

**20 Wann muss ein Pannendreieck auf Freilandstraßen aufgestellt werden?**

- Wenn das Fahrzeug bei Dämmerung oder Dunkelheit zum Stillstand gekommen ist
- Wenn das Fahrzeug bei schlechter Sicht zum Stillstand gekommen ist
- Wenn das Fahrzeug auf einer unübersichtlichen Straßenstelle zum Stillstand gekommen ist
- Es muss kein Pannendreieck aufgestellt werden

**21 Warum muss der Sturzhelm (Patient nicht ansprechbar) abgenommen werden?**

- Zum Überprüfen der Atmung erforderlich
- Gefahr des Erstickens (durch Erbrechen)
- Gefahr des Erstickens (durch zurückgesunkene Zunge)
- Um die Beatmung beim Atem-Kreislauf-Stillstand durchführen zu können

**22 Was soll man bei einem Notruf beachten?**

- Notrufsäulen nur bei Autopannen verwenden
- Den Anweisungen der Leitstelle folgen
- Sich Zeit nehmen und frühestmöglich den Notruf wählen
- Notruf wählen, Notfallort nennen, auflegen und Erste Hilfe leisten

**23 Welche "Techniken" der Helmabnahme gibt es in der Ersten Hilfe?**

- Helmabnahme durch einen Helfer
- Helmabnahme durch zwei Helfer
- Helmabnahme durch drei Helfer
- Helmabnahme durch vier Helfer

## 24 Welche Aufgaben hat der Ersthelfer?

- Retten eines Verletzten aus jeglicher Gefahrensituation
- Basismaßnahmen durchführen
- Essen und Trinken zu verabreichen
- Wundversorgung

## 25 Wie viel Prozent Sauerstoff bekommt der Patient bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung?

- ca. 15 %
- ca. 21 %
- ca. 23 %
- ca. 17 %

## 26 Welche Technik wird bei der Herzdruckmassage im Rahmen der Ersten Hilfe angewendet?

- Be- und Entlastungsphase sollen gleich lang sein
- Möglichst kurze Be- und Entlastungsphase
- Notfallpatienten auf eine harte, unnachgiebige Unterlage legen
- Mitte Brustkorb schnell und kräftig niederdrücken

## 27 Welche Lagerung wird im Rahmen der Ersten Hilfe (bewusstloser Notfallpatient) durchgeführt?

- Stabile Seitenlagerung
- Oberkörper-Hochlagerung
- Lagerung ohne Veränderung der Körperhaltung
- Deckenrolle unter dem Knie

## 28 Welche Methode bezüglich Herzdruckmassage und Beatmung wenden Sie bei der Notfalldiagnose Atem-Kreislauf-Stillstand im Rahmen der Ersten Hilfe an? <br />

- 3 Herzdruckmassagen und eine Beatmung
- 10 Herzdruckmassagen zu 6 Beatmungen
- 15 Herzdruckmassagen zu 2 Beatmungen
- 30 Herzdruckmassagen zu 2 Beatmungen

## 29 Welche Schritte sind in der Ersten Hilfe durchzuführen, wenn der Notfallpatient auf lautes Ansprechen und sanftes Schütteln nicht reagiert?

- Falls normale Atmung feststellbar: Stabile Seitenlage
- Hilferuf, Atemwege freimachen und Atmung kontrollieren
- Suche nach Zusatzverletzungen hat Priorität
- Vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes keine weiteren Maßnahmen erforderlich

---

Erreichte Punkte dieser Seite: \_\_\_\_\_  
Erreichte Punkte bisher: \_\_\_\_\_

Gesamtpunkte dieser Seite: 6

**30 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen (Ersthelfer alleine) sind bei der Notfalldiagnose Atem-Kreislauf-Stillstand durchzuführen? <br />**

- Zweimalige Beatmung und danach den Notruf absetzen
- Diese Maßnahmen werden bis zum Eintreffen der Rettung durchgeführt
- Wenn die normale Atmung wieder einsetzt - Durchführung der stabilen Seitenlage
- Notruf absetzen und sofortiger Beginn mit 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen

**31 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen (Ersthelfer alleine) sind durchzuführen, sobald der Notfallpatient in die stabile Seitenlage gebracht wurde?**

- Alle 10 Minuten Atemkontrolle durchführen
- Durchführung der Basismaßnahmen
- Notruf, regelmäßige Atemkontrolle
- Sofort mit Herzdruckmassage und Beatmung beginnen

**32 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen (Notfallcheck) sind bei einem reglosen Menschen durchzuführen?**

- Laut ansprechen und sanft schütteln
- Es ist nur der Notruf abzusetzen
- Erste-Hilfe-Maßnahmen dürfen nur vom Notarzt durchgeführt werden
- Atemwege freimachen und Atmung kontrollieren

**33 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen werden bei der Notfalldiagnose Atem-Kreislauf-Stillstand durchgeführt?**

- Stabile Seitenlage
- Notruf
- Defibrillator holen (lassen)
- 30 Herzdruckmassagen zu 2 Beatmungen durchführen

**34 Welche Aussagen treffen beim Ausfall des Bewusstseins zu?**

- Für einen in Seitenlage befindlichen Bewusstlosen besteht immer noch Gefahr, da die normale Atmung ausfallen kann
- In der stabilen Seitenlage besteht keine weitere Lebensgefahr
- Eine Bewusstlosigkeit stellt keine Bedrohung des Lebens dar
- Jeder Bewusstlose in Rückenlage befindet sich in Lebensgefahr

**35 Welche Aussagen treffen bezüglich Defibrillation in der Ersten Hilfe zu?**

- Die rechtliche Situation besagt, dass die Defibrillation in einer Notsituation unbedenklich ist
- Die Defibrillation darf nur vom Arzt angewendet werden
- Die Defibrillation darf nur von einem Rettungssanitäter angewendet werden
- Die Defibrillation darf bei Notfallpatienten ab dem 1. vollendeten Lebensjahr angewendet werden

**36 Welche Aussagen treffen im Rahmen der Ersten Hilfe (Bewusstlosigkeit) zu?**

- Erhöhter Oberkörper ist die optimale Lagerung
- Flache Rückenlagerung und Beine hoch lagern
- Auf dem Rücken liegend und mit überstrecktem Kopf lagern
- Stabile Seitenlage zum Freihalten der Atemwege

**37 Wann darf eine Ersthelferdefibrillation nicht angewendet werden?**

- Es gibt keine Kontraindikationen - die Defibrillation darf immer durchgeführt werden
- z.B. bei Säuglingen
- z.B. Patient liegt auf Eisenbahnschienen
- z.B. Patient liegt in einer Wasserlacke

**38 Wann spricht man von einem "bewusstlosen Notfallpatienten"?**

- Notfallpatient reagiert nicht, normale Atmung ist feststellbar
- Notfallpatient ist verwirrt und kann sich an nichts erinnern
- Patient hat keine normale Atmung
- Bewusstseinslage kann durch den Ersthelfer nicht überprüft werden

**39 Was bedeutet "defibrillieren"?**

- flimmern
- früherkennen
- entflimmern
- reanimieren

**40 Was bedeutet die Abkürzung "AED"?**

- Automatische - Eingangs - Dosis
- Automatische - Erdgas - Dauerfunktion
- Automatisierte - Externe - Defibrillation
- Automatisierte - Extrem - Defibrillation

**41 Was soll ein Helfer im Zuge einer Defibrillation (Erste Hilfe) beachten?**

- Die Schockelektroden sollen fest auf den Brustkorb geklebt werden
- Den Patienten nicht berühren (Sicherheitsaspekt)
- Nach Möglichkeit ist ein nasser Brustkorb zu trocknen
- Der Ersthelfer berührt während der Schockabgabe den Notfallpatienten (Qualitätskontrolle)

**42 Wie lautet die Telefonnummer der Vergiftungsinformationszentrale (VIZ)?**

- 01/43 43 43
- 01/144
- 01/34 3 434
- 01/406 43 43

**43 Wie versorgt man einen Patienten (Erste Hilfe) mit einer stark blutenden Wunde?**

- Es ist nur der Notruf abzusetzen
- Pflasterverband anbringen und mit den Fingern darauf drücken
- Fingerdruck bzw. Druckverband
- Basismaßnahmen, verletzten Körperteil hochhalten

**44 Wie wird die Mund-zu-Mund-Beatmung im Rahmen der Ersten Hilfe durchgeführt?**

- Notfallbeatmungstuch über Nase des Notfallpatienten legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Mund zuhalten und 2 Mal beatmen
- Der Helfer hebt nach der Beatmung seinen Kopf und beobachtet die Ausatmung des Notfallpatienten
- Die Beatmung wird ausschließlich durch den Notarzt durchgeführt
- Notfallbeatmungstuch über Mund des Notfallpatienten legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Nase zuhalten und 2 Mal beatmen

**45 Wie wird die Mund-zu-Nase-Beatmung im Rahmen der Ersten Hilfe durchgeführt?**

- Notfallbeatmungstuch über Nase des Notfallpatienten legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Mund zuhalten und 2 Mal beatmen
- Die Beatmung wird ausschließlich durch den Notarzt durchgeführt
- Der Helfer hebt nach der Beatmung seinen Kopf und beobachtet die Ausatmung des Notfallpatienten
- Notfallbeatmungstuch über Mund des Notfallpatienten legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Nase zuhalten und 2 Mal beatmen

**46 Woran erkennt man einen Herzinfarkt?**

- Kopfschmerzen und Ohrensausen
- Schmerzen in der Brust
- Engegefühl in der Brust
- Angst- und Vernichtungsgefühl



#### 47 Woran erkennt man einen Schlaganfall?

- Plötzliche Schwäche, Gefühlsstörung oder Lähmung einer Körperseite
- Querschnittslähmung
- Akute Bauchschmerzen
- Unkontrollierter Stuhl- und/oder Harnabgang

#### 48 Welche typischen Warnzeichen weisen auf einen drohenden Schlaganfall hin?

- Plötzliche Schwäche oder Gefühlsstörungen in einer Körperseite, besonders im Gesicht oder im Arm
- Vorübergehendes Sehen von Doppelbildern
- Plötzlicher Verlust der Sprechfähigkeit oder Schwierigkeiten, Gesprochenes zu verstehen
- Nach oben gerichtete Mundwinkel

#### 49 Welche Vergiftungserscheinungen gibt es?

- Erregungs- und Rauschzustände
- Bewusstseinsstörungen bis Bewusstlosigkeit
- Übelkeit - Erbrechen - Durchfälle
- Pupillenveränderungen, Atemstörungen

#### 50 Welche Lagerung wird bei einer starken Blutung (Erste Hilfe) durchgeführt (z.B. Kreissägenverletzung am Unterarm)?

- Lagerung ohne Veränderung der Körperhaltung
- Beine-Hochlagerung
- Deckenrolle unter dem Knie
- Oberkörper-Hochlagerung

#### 51 Welche Möglichkeiten zur Blutstillung (starke Blutung) gibt es in Ersten Hilfe?

- Direkt in die Wunde greifen
- Fingerdruck
- Druckverband
- Das Hochhalten des verletzten Körperteils ist ausreichend

#### 52 Welche Gefahren bestehen bei einem Insektenstich?

- Schwellung und Rötung des Gewebes im Bereich der Einstichstelle
- Gefahr durch allergische Reaktionen
- Schwellung der Atemwege
- Übertragung einer HIV-Infektion (Aids) möglich

**53 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Kollaps zu setzen?**

- Basismaßnahmen: Beine hoch lagern
- Flache Rückenlagerung
- Nach Schmerzen fragen
- Eis zum Lutschen verabreichen

**54 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einer starken Blutung am Unterschenkel durchzuführen?**

- Verletzten hinlegen
- Verletzten stehen lassen
- Der Ersthelfer soll nur den Notruf absetzen
- Beine hoch lagern und Fingerdruck durchführen/Druckverband anlegen

**55 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Unterkühlungsverdacht zu setzen?**

- Notruf, Basismaßnahmen
- Warme alkoholische Getränke verabreichen, gleichzeitig frottieren
- Warme gezuckerte Getränke verabreichen, Bewegungen vermeiden, gut zudecken
- Durch Erwärmen des Körperkerns das weitere Absinken der Temperatur stoppen

**56 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei zu niedrigem Blutzucker zu setzen?**

- Ist der Betroffene ansprechbar, darf Zuckerhaltiges verabreicht werden
- Wasser oder Bier verabreichen
- Basismaßnahmen durchführen
- Notruf absetzen

**57 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind beim Anlegen eines Druckverbandes durchzuführen?**

- Einmalhandschuhe anziehen
- Keimfreie Wundauflage fest auf die Wunde drücken
- Wundauflage und Druckkörper mit Mullbinde fest umwickeln
- Verletzter soll selbst auf die Wunde drücken

**58 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind im Vergiftungsnotfall durchzuführen (Patient bei Bewusstsein)?**

- Vergiftungsinformationszentrale kontaktieren und Anweisungen durchführen
- Sofort schluckweise Wasser zum Trinken geben
- Zum Erbrechen bringen
- Seitenlage durchführen

**59 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind im Vergiftungsnotfall durchzuführen (Patient nicht ansprechbar)?**

- Gifentfernung durch provoziertes Erbrechen
- Kontrolle der Lebensfunktionen, Notfalldiagnose stellen
- Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) 01/406 43 43 befragen
- Patienten in der vorgefundenen Lage belassen

**60 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind zu setzen, wenn der Abtransport eines Unterkühlten in absehbarer Zeit nicht möglich ist (z.B. Gebirge)?**

- Den Unterkühlten, wenn möglich, an einen windstillen Ort oder in einen warmen Raum (Schutzhütte) bringen
- Warme gezuckerte Getränke verabreichen
- Kalte, nasse Kleidung vorsichtig entfernen - in angewärmte Decken hüllen und eventuelle Erfrierungen keimfrei verbinden
- Warme, trockene Umschläge auf Brust, Bauch und Nacken legen

**61 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Asthmaanfall zu setzen?**

- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper
- Lagerung mit erhöhten Beinen
- Basismaßnahmen durchführen
- Erleichterung der Atmung - Abstützen der Arme

**62 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Herzinfarkt zu setzen?**

- Notruf, Defibrillator und Verbandskasten holen lassen
- Öffnen beengender Kleidungsstücke
- Basismaßnahmen
- Am nächsten Tag den Hausarzt zur Aufklärung aufsuchen

**63 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Schlaganfall zu setzen?**

- Notruf
- Beruhigung, Seitenlage zur Vorbeugung
- Basismaßnahmen
- Öffnen beengender Kleidungsstücke, Frischluftzufuhr

**64 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Sonnenstich/Hitzschlag zu setzen?**

- Betroffenen an einen schattigen Ort bringen
- Wasser zu trinken geben
- Basismaßnahmen
- Kalte Umschläge

**65 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Nasenbluten zu setzen?**

- Patienten hinsetzen und den Kopf nach vorne beugen lassen, betroffenen Nasenflügel zudrücken
- Patienten hinsetzen und den Kopf nackenwärts beugen lassen
- Kalte Umschläge auf den Nacken geben
- Durchführung der Basismaßnahmen

**66 Bei welchen Verletzungen mit starker Blutung ist der Fingerdruck die einzige Möglichkeit zur Blutstillung?**

- Halsschlagaderverletzung, Verletzung in der Leistenbeuge
- Schürfwunde
- Magenblutung
- Bei jeder starken Blutung

**67 Durch körperliche Anstrengung und schwere Arbeit in heißer oder feuchtwarmer Umgebung (hohe Luftfeuchtigkeit) und erschwerter Schweißabgabe (Kleidung) kommt es zu einem Wärmestau und zu einer Erhöhung der Körpertemperatur. Wie nennt man dieses Krankheitsbild?**

- Hypotonie
- Hypertonie
- Hitzschlag, Hitzeerschöpfung
- Hyperventilation

**68 Durch starke Sonnenbestrahlung kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Nackensteife, Bewusstseinsstörungen und Krämpfen kommen. Mit welchen Notfällen ist zu rechnen?**

- Hitzeerschöpfung
- Sonnenstich
- Hitzschlag
- Hitzekrampf

**69 Was sollte der Ersthelfer bei der Blutstillung vermeiden?**

- Verwendung von Mullbindenverbänden
- Durchführung der Basismaßnahmen
- Direkter Kontakt mit Blut
- Verwendung einer keimfreien Wundauflage

**70 Was versteht man unter einer starken Blutung?**

- Wenn das Blut im Schwall austritt
- Wenn das Blut aus der Wunde spritzt
- Wenn das Blut aus der Wunde tropft
- Wenn aus einer Wunde innerhalb kurzer Zeit eine große Blutmenge verloren geht

**71 Was versteht man unter einer Vergiftung?**

- Nur feste Stoffe können Vergiftungen hervorrufen.
- Nur bei Aufnahme großer Mengen schädlicher Substanzen kann von einer Vergiftung gesprochen werden.
- Vergiftungen entstehen am häufigsten bei Gefahrgutunfällen
- Das Auftreten schwerer, oft lebensbedrohlicher Krankheitsbilder nach Aufnahme giftiger Substanzen

**72 Wodurch können Verbrennungen bzw. Verbrühungen entstehen?**

- Kontakt mit elektrischem Strom
- Heiße Flüssigkeiten und Dämpfe, Hitzestrahlung
- Berührung heißer Gegenstände, offenes Feuer
- Flüssig gelagerte Gase

**73 ?Ab welchem Verbrennungsgrad soll ein Arzt aufgesucht werden?**

- Immer
- Verbrennungen mit Blasenbildung größer als eine Handfläche
- Verbrennungen 1. Grades bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Fieber und Unwohlsein
- Verbrennungen 3. Grades

**74 Welche Verbände werden in der Ersten Hilfe verwendet?**

- Gürtelverbände
- Heftpflasterverbände
- Dreiecktuchverbände
- Mullbindenverbände

**75 Welche Zeichen deuten auf einen Schlangenbiss hin?**

- Starke Blutung
- Punktförmige Wunden (Fangmarken) in Stecknadelkopfgröße
- Im Bereich der Bissstelle treten Lähmungserscheinungen auf
- Vergiftungserscheinungen möglich, jedoch im Allgemeinen nicht lebensbedrohend

**76 Welcher Zeitraum ist zur Versorgung von Wunden durch einen Arzt maßgeblich?**

- Innerhalb von 2 Stunden
- Innerhalb von 4 Stunden
- Innerhalb von 6 Stunden
- Bei ausgedehnten Verletzungsmustern sofort

**77 Welche Prinzipien gelten bei der Wundversorgung (Erste Hilfe)?**

- Fremdkörper in der Wunde belassen
- Kein Anwenden von Salben, Puder.....
- Kein Berühren, Reinigen
- Einmalhandschuhe für den Ersthelfer nicht unbedingt notwendig

**78 Welche Gefahren können durch einen Schlangenbiss entstehen (heimische Schlangen)?**

- Schlangenbisse sind grundsätzlich tödlich
- Vergiftungs- und Lähmungserscheinungen mit Spätfolgen
- Vergiftungserscheinungen möglich, jedoch nicht lebensbedrohend
- Kreislaufstörungen, allergische Reaktion möglich

**79 Welche Infektionserkrankungen können durch Bisse infizierter Zecken übertragen werden?**

- Mumps
- Borreliose
- Typhus
- Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

**80 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einer Verätzung und Kontamination der Haut mit organischen Lösungsmitteln zu setzen?**

- Die betreffende Hautstelle mit handwarmem Wasser spülen
- Das Eintreffen des Roten Kreuzes (Rettung) abwarten, keine Erste Hilfe möglich
- Keimfreien Verband anlegen (metallisiert, wenn vorhanden)
- Notruf, Basismaßnahmen

### 81 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Verätzungen zu setzen?

- Kleider nicht entfernen, um die bereits geschädigte Haut nicht weiter zu verletzen
- Keimfreien Verband anlegen, Notruf und Basismaßnahmen
- Sofort mit reinem handwarmen Wasser intensiv spülen, darauf achten, dass das abfließende Wasser den kürzesten Weg über die Haut nimmt
- Sofort die mit ätzender Substanz getränkten Kleider entfernen

### 82 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Verdacht auf Erfrierung zu setzen (Patient ist ansprechbar)?

- Keimfreien Verband anlegen, Zudecken hat große Bedeutung
- Notruf, Basismaßnahmen
- Beengende Bekleidung öffnen und warme, gezuckerte Getränke verabreichen
- Alkohol zu trinken geben, dadurch werden die Gefäße erweitert und wärmendes Blut versorgt den Körperkern

### 83 Welche Aussagen treffen im Zuge der Versorgung (Erste Hilfe) von Brandwunden zu?

- Spülung mit handwarmem Wasser, Patienten darf es nicht frösteln
- Versorgung mit speziellen Wundauflagen (metallisiert), wenn vorhanden
- Die Spülung mit kaltem Wasser darf auf keinen Fall angewendet werden
- Die Spülung soll mit kaltem Wasser für mindestens 20 Minuten durchgeführt werden

### 84 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nach einem Biss durch eine heimische Giftschlange zu setzen?

- Warme Umschläge auf die Bissstelle legen
- Verbinden der Wunde und kalte Umschläge auf die Bissstelle legen
- Verletzten Körperteil heftig bewegen lassen, kalte Umschläge auf die Bissstelle legen
- Durchführung der Basismaßnahmen, Notruf

### 85 Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nach einem Zeckenbiss zu setzen?

- Ungeimpfte sollen nach einem Zeckenbiss auf jeden Fall zum Arzt
- Öl auftropfen, durch kreisende Bewegung Zecken lockern und entfernen
- Bei späteren Rötungen bzw. Entzündungen ist der Arzt aufzusuchen.
- Mit einer Pinzette möglichst weit vorne fassen und ganz gerade herausziehen

**86 Nennen Sie die Versorgung von Wunden.**

- Den Verletzten hinsetzen, Wunde nicht berühren, aber von den größten Verunreinigungen befreien und einen desinfizierenden Puder auftragen
- Den Verletzten hinsetzen oder hinlegen, Wunden keimfrei verbinden, wenn notwendig Arzt oder Krankenhaus aufsuchen - möglichst sofort, jedoch innerhalb von 6 Stunden
- Wunden keimfrei verbinden, dabei die Wunde nicht berühren und sicherheitshalber so nahe wie möglich bei der Wunde abbinden, Arzt oder Krankenhaus aufsuchen - möglichst sofort, jedoch innerhalb von 9 Stunden
- Den Verletzten hinsetzen oder hinlegen, Wunden keimfrei verbinden, dabei die Wunde auf jeden Fall mit klarem Wasser auswaschen und Desinfektion vornehmen. Keine Salben, Puder oder Hausmittel verwenden, Fremdkörper zur Schmerzlinderung entfernen.

**87 Wann muss man auch mit einer geringfügigen Verletzung (Wunde) zum Arzt?**

- Wenn der verletzende Gegenstand weniger als 1,5 mm eindringt
- Wenn der Verletzte nicht aktiv gegen Tetanus geimpft ist
- Wenn eine kleine Rötung zu sehen ist
- Wenn die Wunde schmerzt

**88 Wann wird ein Pflasterwundverband verwendet?**

- Zeckenbiss
- Bei kleinen, nicht stark blutenden Wunden
- Verbrennungen
- Erfrierungen

**89 Warum kann ein Zeckenbiss gefährlich sein?**

- Übertragung von Tollwut
- Übertragung von anderen Krankheiten (z.B. Borreliose)
- Übertragung von Hirnhautentzündung
- Übertragung von Wundstarrkrampf

**90 Warum werden bei schwerer Schädigung eines Auges beide Augen keimfrei bedeckt?**

- Um die Lichtstärke zu vermindern
- Ohne Bedeckung würde das verletzte Auge synchron den Bewegungen des unverletzten Auges folgen
- Damit die Schädigung nicht auf das unverletzte Auge übergreifen kann
- Um bleibendes Schielen zu verhindern



**91 Was bewirkt die Anwendung von Wasser bei Verbrennungen und auf welche Kennzeichen ist zu achten?**

- Verhindert das Nachbrennen im Gewebe und führt zur Schmerzlinderung
- Sofort unter reines, fließendes handwarmes Wasser halten
- Führt zu einer erhöhten Infektionsgefahr und Blutvergiftung
- Ist dem Verletzten kalt, ist die kühlende Spülung zu stoppen

**92 Was ist das Prinzip bei der Versorgung von chemischen Wunden?**

- Neutralisierung durch die Verabreichung von Gegenmitteln
- Bei chemischen Wunden im Verdauungstrakt stets zum Erbrechen bringen
- Die rasche Entfernung bzw. Verdünnung der ätzenden Substanz
- Patienten in sitzender Position so schnell wie möglich zum Betriebsarzt bringen

**93 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen werden bei Verätzungen im Bereich des Verdauungstraktes gesetzt?**

- Kontaktaufnahme mit der Vergiftungsinformationszentrale: 01/4064343
- Mund ausspülen, anschließend mit Salzwasser zum Erbrechen bringen
- Sofort Wasser in kleinen Schlucken zu trinken geben, um die Substanz zu verdünnen
- Mund ausspülen, Seitenlage, Notruf und Basismaßnahmen

**94 Wie wird ein Armtragetuch am besten angelegt?**

- Spitze des Dreiecktuches verknoten
- Tuch vorsichtig unter dem verletzten Arm durchziehen
- Tuch vorerst unter dem unverletztem Arm durchziehen, auf die verletzte Schulter ablegen
- Die Enden des Dreiecktuches seitlich im Nacken verknoten

**95 Welche Symptome und Komplikationen bei einer Verrenkung gibt es?**

- Schmerzen, abnorme Stellung, Bewegungsunfähigkeit
- Überdehnung und Zerreißen der Gelenkkapsel und der Bänder
- Leichte Schmerzen, normale Stellung, Bewegung etwas eingeschränkt
- Blutung ins Gelenk

**96 Welche Kennzeichen (Erkennen) gibt es bei Knochen- und Gelenksverletzungen?**

- Schmerzen, Schwellung, Schonhaltung
- Abnorme Fehlstellung
- große Beweglichkeit trotz Schwellung
- Bewegungsunfähigkeit oder Bewegungseinschränkung

**97 Welche dieser Tätigkeiten sind vor der Ausübung von Sport sinnvoll?**

- Aufwärmen
- Schutzausrüstung anlegen
- Kühlende Salben auf schmerzende Gelenke schmieren
- Eisspray auf Gelenke sprühen

**98 Wann soll bei Quetschungen ein Arzt aufgesucht werden?**

- Wenn nach 24 Stunden noch keine Besserung eingetreten ist
- Leichte Schmerzen
- Ausgedehnte Blutergüsse
- Verdacht auf innere Verletzungen

**99 Welche allgemeinen Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Knochen- und Gelenksverletzungen zu setzen?**

- Bei offenen Verletzungen keimfreien Verband anlegen
- Beengende Kleidungsstücke über der Verletzung lockern
- Ruhigstellung, bei Verstauchung zusätzlich kühlen
- Basismaßnahmen und Notruf

**100 Welche Aufgaben hat der Helfer bei einer Verstauchung?**

- Kühlung der Schwellung
- Schonung des Gelenks
- Kompressionsverband anlegen
- Verletzten Körperteil erhöht lagern